

PLATEAU D'IMAGERIE MEDICALE
HOPITAL xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bureau IDE xxxxx

Scanner xxxxx

Accueil xxxxx

Etiquette du patient

Service demandeur :

CIMENTOPLASTIE ET BIOPSIE OSSEUSE

COAGULATION

TP:

TCA:

Plaquettes:

ANTIAGREGANTS : Aspégic, Kardégic, Aspirine, Plavix, Ticlid, Pravadual, Duoplavin

Arrêter le traitement pendant 8 à 10j si possible sinon prendre un avis cardiologue.

HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRE (HBPM) :

Calciparine, Fraxiparine, Fraxodi, Lovenox, Fragmine, Innohep, Arixtra, Orgaran

Examen réalisable 12h après l'injection de la veille et reprise 12 h après le geste.

ANTITHROMBINES : Pradaxa (cp), Xarelto (cp), Arganova (inj)

Examen réalisable 12h après l'administration de la veille et reprise 12 h après le geste.

ANTI-VITAMINES K (AVK) : Sintrom, Minisintrom, Préviscan, Coumadine

Aucune ponction osseuse ne doit être réalisée sous AVK

Si les anticoagulants sont indispensables :

- Faire un relais par HBPM (ou Héparine calcique si le cardiologue le demande), le geste sera alors réalisable dès que TP > 65%, INR normal (inf. ou égal à 1) et sera réalisable 12 h après l'injection d'Héparine de la veille.

PREMEDICATION

ACTISKENAN cp : le patient doit arriver avec la prescription et le comprimé d'Actiskenan la prémédication sera effectuée dans le service de Radio

Les contre-indications ou autres prises en charge de la douleur doivent être signalées à la prise de RDV.